

Magatzems **JORBA**

SECCIONS

Camiseria, Perfumeria,
Merceria, Teixits, Ro-
ba blanca. Alfombres,
Matalassos, Panyeria,
Llaneria, Sabates, Go-
rres, Joieria, Rellotge-
ria, Objectes pel cul-
te, Queviures, Mobles,
etc. etc.

M A N R E S A
I
BARCELONA

●
ELS MÉS IMPORTANTS
ELS MILLORS ASSORTITS
ELS MÉS ECONÒMICS

●
*CONTINUAMENT ARTICLES
DE VERTADERA OCASIÓ.*

TALLERS

Camiseria, Gorres,
Sastreria, Modista,
Roba blanca, Mata-
lasseria, Joieria, Re-
llotgeria, Dibuij, Mo-
bles, Sastreria, Esta-
tuària, Optica, Gra-
var miralls, etc. etc.

Els conills molts cops no presenten altres símptomes que l'aflluïment i moren sense altra senyal; altres vegades es presenten diarrees, debilitat, convulsions, morro mullat i sobretot timpanitis (conills triputs). Els conills vells generalment no presenten aquests símptomes encara que tinguin el fetge carregat de coccidis.

La manera més pràctica de conèixer si els fems contenen coccidis és barrejarlos amb una solució concentrada de clorur de sodi (sal comú). Aleshores els coccidis puguen a la superfície formant espores com una mena de floridura.

Per a matar aquests paràsits és molt bo ruixar els fems amb una solució forta de sulfat de ferro y barrejar-los també amb calç viva abans d'ésser estesos al camp.

Els conillers també han d'ésser objecte d'una desinfecció rigorosa; ben netejats, fumigats i emblanquinats afegint a la calç un desinfectant, com és el Niptol, o bé àcid sulfúric al 4 % i encara deixar-los reposar dos o tres mesos sense posar-hi nou bestiar.

Pel tractament dels malalts, el professor Vilcop recomana l'extracte eteri d'arrels de falguera mascle barrejat amb oli i del qual s'impregnen els aliments com la civada o segó. El susdit professor diu haver obtingut bons resultats puix que els conills tractats així han recobrat els seu vigor, i al lliurar-los al consum solament

s'han trobat insignificants lesions hepàtiques. Nosaltres havem obtingut alguns resultats amb l'administració d'àcid silícific. També és bo donar-los branques per rosegat, sobre tot les de salze i alba qual escorça conté un glicósit que en diuen salacina amb el que es pot preparar l'àcid silícific.

El professor Mocesou de l'Escola de Veterinaria d'Alfort recomana l'oli timolat a la dosis d'una cullerada per cada cinc conills, durant vuit dies.

Es convenient que la netedat en els conillers sigui freqüent i molt rigorosa, doncs les coccidies expulsades

ESTORES, HULES I ALFOMBRES
FÀBRICA DE PERSIANES, CORTI-
NES "FIUDUR"

Tomàs Fius

Sobrerroca, 11 MANRESA Telèfon, 1734